

แนวทางการให้ยา Iron sucrose (Venofer) ในผู้ป่วยฟอกเลือด

วิธีการให้ยาทาง IV push เท่านั้น

ขนาดยา: 100 มก.

วิธีให้: ฉีดยา 5 cc ภายใน 5 (2-10) นาที ทาง venous side

ความถี่: ทุกครั้งที่ HD (max = 3)

เวลา: ระหว่าง HD แนะนำให้ก่อนสิ้นสุดการฟอกเลือดอย่างน้อย 30 นาที

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

- คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดศีรษะ
- ปวดบริเวณที่ฉีดยา
- หากมีอาการเล็กน้อย แนะนำให้ยาฉีดอัตราช้าลง
- หากมีอาการมาก ให้หยุดยาทันที
- อาการแพ้ พบได้น้อย แต่เกิดได้ทุกครั้งที่ฉีดยา แพ้ก่อนนี้ไม่เกิด**
(ต้องพร้อมในการรักษาทุกครั้ง)

ข้อควรระวัง

- เฝ้าระวังอาการแพ้ เช่น hypotension, หายใจลำบาก ผื่นแดง
- ห้ามใช้ร่วมกับ HCO₃ และยาอื่นๆ