

แนวทางปฏิบัติการให้ยา Heparin

- การตัดสินใจ หยุด heparin ระหว่างการฟอกเลือด เนื่องจากระดับ BP ไม่มีเกณฑ์ที่เป็นตัวเลขชัดเจนในระดับสากลที่ระบุว่าควรหยุด heparin ขึ้นอยู่กับการพิจารณาทางคลินิกโดยแพทย์เป็นรายบุคคล
- ผมขอเสนอแนวทางปฏิบัติ ดังนี้:
 1. ผู้ป่วยที่มี BP <180/110 mmHg ยังคงใช้ heparin ในการฟอกเลือดได้ แต่ควรติดตามระดับ BP อย่างใกล้ชิด ร่วมกับ
 - หากผู้ป่วยล้มกินยามาให้กินยาลดความดันได้เลย
 - หากผู้ป่วยไม่กินยามา เพราะกินยาแล้ว BP ต่ำ ไม่แนะนำให้กินยา
 - ผู้ป่วยที่มี BP > 180/120 mmHg (emergency hypertension) หรือ BP > 180/110 mmHg (Uncontrolled hypertension) ร่วมกับมีความเสี่ยง ได้แก่
 - ประวัติเลือดออกในสมอง
 - ภาวะเลือดออกในอวัยวะสำคัญควรหลีกเลี่ยงการให้ heparin และรายงานแพทย์